



Grandes Cultures

DLP 05-8-04014766

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

ILE DE FRANCE

Bulletin Technique n°26 du 4 août 2004 - 2 pages - Numéro ordre postal : 45

Maïs

Chrysomèle

Un nouveau foyer de chrysomèle du maïs a été détecté la semaine dernière dans la région, sur la commune de Pierrelaye (95), zone de monoculture de maïs. Le renforcement du piégeage par la FREDON a permis des captures nombreuses sur plusieurs pièges. Un dispositif de lutte va être mis en place conformément à l'arrêté de 2002, dans un rayon de 10 km.

En ce qui concerne les foyers de Roissy et Orly, aucune capture n'a été enregistrée à ce jour depuis le début du suivi fin juin. Le deuxième traitement aduicide démarre.

Pyrale

Le profil de vol de cette année est atypique comme le montre le graphique avec un pic de vol enregistré 7 à 8 semaines après les premières captures au lieu de 3 à 5 semaines généralement. Par contre, les premières pontes ont bien été détectées à une date normale.

Le suivi réalisé par la FREDON dans le cadre de la biovigilance pyrale sur une

parcelle à Jaulnes (77) indique que l'on a déjà comme l'an passé un début de nymphose, donc un probable début de deuxième génération.

Betteraves

Maladies


L'oïdium est actuellement bien maîtrisé par les fongicides. A noter cette année, la présence précoce de rouille avec jusqu'à 50% de pieds qui étaient porteurs de pustules comme à Nangis (77), Gironville / Essonne, Boutervilliers, Méréville (91), Puisieux en France, Livilliers (95)..
Observez vos parcelles à partir de 3 semaines après la première intervention, et ré-intervenir en cas de redémarrage des maladies.

Ravageurs

On a toujours en permanence un certain niveau de plantes porteuses de pontes de pégomysies. En moyenne sur notre réseau, cette fréquence était de :
14% au 19/7 (surtout dans le 91 et en partie 77)
23% au 26/7 (91 et 77)
9% au 2/8 (surtout 95).
Les dégâts restent cependant minimes

Vol pyrale 2004

Nbre moyen captures



Maïs

Nouveau foyer de chrysomèles dans la région.


Service Régional de la
Protection des Végétaux
ILE DE FRANCE
10 rue du séminaire
94516 RUNGIS cedex
Tél : 01-41-73-48-00
Fax : 01-41-73-48-48

Bulletin réalisé avec la
participation de la
FREDON Ile de France

Imprimé à la station
D'Avertissements
Agricoles de Rungis
Directeur gérant :
D. FERRIEU

Publication périodique
C.P.P.A.P.
n°0904 B 00536
ISSN n°0767-5542

Tarif individuel 2004 :
68 euros

avec  l'ordre de 10% des plantes avec des galeries.

Les noctuelles sont très peu présentes.

Infos diverses

Colza

Les observations réalisées après récolte montrent la présence fréquente de larves de baris dans les pivots. Les attaques les plus fortes concernent surtout le centre et le nord Seine et Marne avec de 1 à 2 larves / pied à Barcy, Chailly en Brie, Mons en Montois, Touquin, Chaumes en Brie, Saint Jean les deux Jumeaux, ... C'est le cas aussi à Bullion (78) et Janvry (91), ainsi qu'à Maisse (91). Un vol important de baris avait été signalé du 16 au 22 mars.

Blé

Les premiers résultats d'analyse montrent une forte fréquence de détection de souches de septoriose résistantes aux strobilurines.

Feverole

Comme l'an passé, nous reconduisons l'enquête bruche destinée à mettre en relation le niveau d'attaque des graines avec la nature de la protection insecticide réalisée.

Pour cela, nous vous demandons :

- soit de nous indiquer le niveau d'attaque déterminé à la livraison par votre organisme stockeur,
- soit de nous mettre à disposition un échantillon d' 1 kg maximum que nous récupérerons lors de nos tournées. Un échantillon

Merci de nous retourner cette fiche :

NOM :

COMMUNE :

TEL :

☐

Niveau d'attaque :

☐

Nous tenons à votre disposition un échantillon

VARIETE :

PROTECTION INSECTICIDE hors traitement AZTEC contre pucerons
(date, produit, dose)